



การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน และความจำเป็นของเข็มที่ 3



- 01 วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ ในขณะนี้แนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม โดยทั่วไปอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่ 2 มักน้อยกว่าเข็มแรก
- 02 มีข้อกังวลในกรณีที่แพ้ หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดกันได้เข็มที่ 2
- 03 การศึกษาวิจัยพบว่า การให้วัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกัน คือ สลับระหว่างวัคซีนแอสตราเซนเนกาและวัคซีนชนิด mRNA กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่อาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม
- 04 ยังไม่มีข้อมูลที่สรุปได้ว่าควรให้วัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นเมื่อใด และใช้วัคซีนชนิดไหน เป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด ถ้าต่างชนิดควรใช้อะไรก่อนหลัง ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องทำวิจัยเพิ่มเติม

ที่มา : ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ. พว.ยง ภู่วรวรรณ
ผศ. พว.กัธร มาลาธรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
www.si.mahidol.ac.th

f sirirajpr
@Siriraj
02-419-7000



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
www.chulalongkornhospital.go.th

f ChulalongkornHospital
@chulahospital
02-256-4000 ต่อ 0



โรงพยาบาลรามาธิบดี
www.rama.mahidol.ac.th

f ramathibodi
@ramathibodi
02-200-3000

